Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Катерина

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.07.2005 11:41:32

формирования заключения врача: 16.07.2005 19:35:31

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/10584/answer/10585

Заключение врача

Уважаемая Катерина! Такое состояние могло возникнуть при атонии (отсутствии тонуса) выводящих протоков предстательной железы, которое встречается при воспалительных заболеваниях предстательной железы. Для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики Вашему молодому человеку необходимо тщательно обследоваться под контролем уролога: на урогенитальную инфекцию - хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреаплазмы; сдать общий анализ мочи, посев секрета простаты на флору и чувствительность к антибиотикам, секрет простаты, УЗИ (или ТРУЗИ) мочевого пузыря и предстательной железы. После этого можно будет решить – есть патология или нет, назначить лечение (если необходимо). Удачи!