Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: татьяна

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.08.2005 01:20:58

формирования заключения врача: 08.08.2005 16:44:35

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/10926/answer/10927

Заключение врача

Уважаемая Татьяна! К сожалению, на однократной консультации невозможно все узнать. Вашей девочке необходимо сделать контрольные анализы – общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, остаточный азот, глюкоза, общий белок), УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи), экскреторная урография (рентгенисследование почек с контрастным препаратом), консультация эндокринолога (на предмет сахарного диабета). Неполное удвоение почки – это достаточно часто встречающаяся аномалия развития мочевыводящей системы. Неравномерное мочеиспускание иногда наблюдается не только у детей, зависит от водного режима и поведения (активное, двигательное и т. д.). Запах мочи зависит от инфеции (но у Вас посев мочи отрицательный), от уровня сахара в крови, и т. д. Что касается колебаний белка и лейкоцитов в моче – то насколько они диагностически значимы? Обязательно проконсультируйте ребенка еще раз у нефролога и эндокринолога. С уважением.