Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Татьяна

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 02.09.2005 05:02:50

формирования заключения врача: 04.09.2005 17:50:16

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/11302/answer/11303

Заключение врача

Уважаемая Татьяна! Есть инфекция, которая передается половым путем – это хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, трихомонады, кандиды, гарнереллы, вирус простого герпеса, цитомегаловирус и т. д. В случае выявления этих инфекций лечение проводится одновременно обоим половым партнерам. Кишечная палочка относится к банальной флоре, она в норме находится в организме человека, но при определенных условиях становится патогенной (болезнетворной). В случае выявления кишечной палочки не требуется лечение полового партнера, она не передается половым путем. Кроме полового пути передачи, микробы могут заноситься из прямой кишки (например, та же кишечная палочка), с током крови из других очагов инфекции в организме. Удачи!