Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: алина

Возраст: 40

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.11.2009 22:56:00

формирования заключения врача: 18.11.2009 11:12:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/117662/answer/117663

Заключение врача

Уважаемая Алина!

1. При диагностике цистита анализы на ЗППП сдаются методом ПЦР! Антитела не являются показанием для назначения лечения!

2. Также для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики Вам необходимо обследоваться под контролем уролога: сдать общий анализ мочи; посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам; УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи).

3. Также нужен осмотр на кресле на предмет диспозиции уретры (слишком низкого ее расположения по отношению к влагалищу, в результате чего выделения из влагалища и области промежности во время полового акта попадают на уретру и потом в мочевой пузырь).

4. Также нужно обследование полового партнера на ЗППП.

5. Возможно, потребуется выполнение цистоскопии.

В зависимости от результатов можно будет назначить правильное лечение. Удачи.