

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Марина

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 10.10.2005 10:33:22

**формирования заключения врача:** 10.10.2005 18:55:42

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/12000/answer/12001>



## Заключение врача

Уважаемая Марина! У многих женщин возникает подобная проблема - обострение хронических заболеваний почек в период беременности. Этому способствуют несколько факторов: большая нагрузка на почки - вас теперь двое (первая причина); нарушение оттока мочи - беременная матка сдавливает мочеточники (вторая причина), от этого происходит застой мочи в верхних мочевых путях и при наличии инфекции (третья причина) создаются условия для возникновения пиелонефрита беременных. Далее, во время беременности в женском организме содержится повышенный уровень прогестерона (он необходим для сохранения беременности), этот гормон вызывает расслабление стенок мочеточников и их расширение (дилатацию). Это приводит к тому, что снижается тонус мочеточников и происходит нарушение оттока мочи (четвертая причина). Возможно, у Вас имело место отхождение солей. Вы совершенно правы, что принимали канефрон. Канефрон - это препарат на основе растительных компонентов - травы золототысячника, любистока и розмарина. Он обладает противовоспалительными, антисептическими, спазмолитическими свойствами (т. е. влияет на те причины, которые я Вам написал выше), ещё одно хорошее свойство то, что его можно применять при беременности, он не влияет на развитие плода, на тонус матки. Вам можно рекомендовать принимать канефрон до 3-4 недель (в общей сложности), потом сделать общий анализ крови и общий анализ мочи, креатинин и мочевины крови, следить за артериальным давлением, наблюдаться у уролога для предотвращения возникновения рецидива макрогематурии. После родов необходимо будет тщательно обследоваться - УЗИ, экскреторная урография, цистоскопия. Пишите, буду рад помочь Вам.