Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** Оксана

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

## Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 10.12.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 10.12.2003 12:00:00

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/1234/answer/1235

## Заключение врача

Уважаемая Оксана! Активизация любого воспалительного процесса может произойти именно в первые месяцы беременности. Предрасполагающим фактором является нарушение гормонального баланса. Эстрогены – женские половые гормоны – приводят к атонии (отсутствие тонуса) мочевых путей, предрасполагают к возникновению воспаления не только в мочевом пузыре, но и в почках. Нарушение оттока мочи вследствие атонии мочевых путей и мочевого пузыря являются условием для активизации патогенной флоры, а, возможно, присутствующий при этом пузырно-мочеточниковый рефлюкс (заброс) способствует проникновению ее (флоры) в почки. Сделайте новый посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, т. к. золотистый стафилококк не должен в норме присутствовать в моче, он как раз и является патогенным микроорганизмом. После получения результата можно будет определиться с проведением антибактериальной терапией, подобрать такие препараты, которые можно применять при беременности. Присутствующая инфекция в организме гораздо более опасна и для Вас, и для ребенка, чем правильно и грамотно проведенная антибиотикотерапия. Фитолизин не применяется в виде монотерапии (т. е. один) для лечения воспалительных заболеваний. Удачи!