Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Евгения

Возраст: 36

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.01.2010 06:54:00

формирования заключения врача: 19.01.2010 07:18:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/127160/answer/127161

Заключение врача

Уважаемая Евгения!

1. Инфекции вряд ли являются причиной данного состояния. Преждевременная эякуляция может встречаться при сильном половом влечении, при сильной половой конституции, после длительного воздержания, при нерегулярной половой жизни. В этом случае можно рекомендовать разные методы продления полового акта - ведение регулярной половой жизни с постоянным партнером (поведенческая терапия – метод стоп-старт), использование мазей, пролонгирующих (удлиняющих) половой акт, презервативов со специальной пролонгирующей смазкой.

2. После первого полового акта в норме существует период абсолютной рефрактерности, в течение которого эрекция невозможна, или сопровождается дискомфортом, или половой акт носит "затяжной" характер. Это норма.

Удачи.