Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дмитрий 28 лет

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 18.11.2005 01:54:34

формирования заключения врача: 18.11.2005 18:33:32

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/12816/answer/12817

Заключение врача

Уважаемый Дмитрий! Вместе с Вами должен был пролечиться Ваш половой партнер (если постоянный). То есть, если Вы вступили вновь в незащищенный половой контакт, то есть вероятность вторичного заражения. Чтобы точно выяснить причину жжения и резей в мочеиспускательном канале, надо повторно обследоваться: на хламидии, трихомонады, кандиды, уреаплазмы, микоплазмы, кандиды, герпес типа 1,2 и сдать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Взгляды по поводу необходимости лечения урогенитальной инфекции остается открытым, на мой взгляд – лечить надо. Пока не принимайте никаких антибиотиков, обследуйтесь. А когда будет выяснена причина – провести лечение. Удачи!