

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.11.2005 14:31:26

формирования заключения врача: 01.12.2005 20:43:54

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/13066/answer/13067



Заключение врача

Уважаемый Владимир! Никаих особых эффективных методов по профилактике снижения функции гипоплазированной почки нет. При односторонней гипоплазии почки больные нуждаются в лечении только при осложнении этой аномалии пиелонефритом. Показания к операции нефрэктомии (удаление почки): прогрессирующий пиелонефрит, не поддающийся лечению; прогрессирующая артериальная гипертензия (злокачественная, т. е. также не поддающаяся коррекции); различные гнойные осложнения (например, гнойное расплавление камня почки). При таких состояниях удалять почку надо обязательно, т. к. происходит иммунное воздействие на здоровую почку. Подводя итог, ещё раз: Вам необходимо выяснить функционирует ли почка, если пиелонефрит - то серьезно пролечить. Если есть вышеназванные осложнения, то, скорее всего, почку надо удалять. Ваш уролог располагает такими данными, которыми невозможно располагать при виртуальной консультации - осмотр, результаты всевозможных исследований (моча, УЗИ и т.д.), возможно, что всё взвесив, он принял решение о необходимости операции. Если все-таки придется оперироваться, то сейчас существуют лапароскопические методы операций при гипоплазии почки - это и меньшая травматичность, и хороший косметический эффект. Вам необходимо вместе с лечащим урологом все взвесить и прийти к общему согласию и тактике. Выздоравливайте.