Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Елена

Возраст: 39

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 16.02.2010 17:55:00

формирования заключения врача: 19.02.2010 13:39:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/132398/answer/132399

Заключение врача

Уважаемая Елена! В Ваше ситуации надо:

1. Обследовать полового партнера и Вас на ЗППП методом ПЦР. Если уреаплазмы будут положительными, то надо лечиться обоим, под прикрытием противогрибковых препаратов. Также необходимо сдать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Все эти анализы надо сдавать не ранее, чем через 4 недели после последнего приема антибиотиков (если Вы их принимали).

2. Гинеколога не занимаются лечением цистита!

3. Если все инфекции будут отрицательными и объективной причины цистита не будет найдено, показано выполнение цистоскопии с биопсией из подозрительных участков, КУДИ - комплексного уродинамического исследования.

4. Разумеется, все эти исследования Вам надо делать не самостоятельно и не по заочным советам, а по назначениям уролога, который будет Вами заниматься.

Удачи.