Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Влада

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.12.2005 12:36:36

формирования заключения врача: 12.12.2005 18:13:43

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/13312/answer/13313

Заключение врача

Уважаемая Лада! Уреаплазмы передаются половым путем и являются возбудителями воспалительных заболеваний мочеполовых органов (в том числе цистит) и у женщин, и у мужчин. У женщин при воспалительных заболеваниях гениталий уреаплазмы часто обнаруживаются во влагалище и шейке матки, может служить причиной бесплодия (это достоверно доказано) и выкидышей (обнаружили уреаплазмы в амниотической жидкости). У женщин развивается бесплодие вследствие выраженных склеротических изменений фаллопиевых труб вплоть до их обтурации, деструкции эпителия, нарушение внутриорганного кровообращения. У мужчин уреаплазмы и микоплазмы вызывают воспалительные заболевания предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря. Лечение назначается ОДНОВРЕМЕННО обоим партнерам, причем во время лечения и до получения отрицательного контрольного результата не рекомендуется жить половой жизнью. В Вашем случае – проводилось ли лечение Вашему половому партнеру? Делали ли анализы на определение титра (концентрации) уреплазм в крови? Уреаплазма лечится только антибиотиками, все отстальные препараты (иммуностимулирующие), физиопроцедуры нояст только вспомогательный характер. С уважением.