Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Евгений

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.12.2005 08:57:01

формирования заключения врача: 12.12.2005 20:02:11

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/13328/answer/13329

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемый Евгений! Чтобы диагностировать стриктуру уретры необходимо выполнить простое исследование – цистоуретрографию – наполнить мочевой пузырь разведенным контрастным веществом, сделать R-снимок, потом помочиться и в момент мочеиспускания сделать повторный снимок. Симптомы стриктуры – затрудненное мочеиспускание, необходимость натуживания, тонкая и прерывистая струя мочи, которая может разбрызгиваться, большое количество остаточной мочи при УЗ-исследовании мочевого пузыря. Если есть возможность у Вас и Вашего лечащего врача – то можете сделать вышеуказанное обследование. С уважением.