Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Львов Аркадий

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.12.2005 11:50:55

формирования заключения врача: 14.12.2005 21:43:35

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/13402/answer/13403

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемый Аркадий! Сморщивание почки не приводит к повышению креатинина, если вторая почка справляется с двойной нагрузкой. Такое повышение креатинина, веротянее всего, связано со снижением функции и второй почки. На УЗИ можно увидеть только сморщивание (уменьшение размеров, истончение паренхимы и т. д.). Для оценки функции почек необходимо сделать радиозотопное исследование почек. Пока, к сожалению, Вам необходимо непрерывно принимать такие прапараты, как леспенефрил, леспефлан. При дальнейшем повышении креатинина показаны экстракорпоральные методы очистки крови (диализ). При повышенном давлении (170/95) баня и сауна категорически противопоказаны. С уважением.