Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дмитрий

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.12.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 20.12.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/1372/answer/1373

Заключение врача

Уважаемый Дмитрий! Для того, чтобы выяснить причину ослабления эрекции, мало только одного повышенного билирубина. Вам надо пройти комплексное обследование: УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки); общий анализ мочи; сок простаты; посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам; на урогенитальную инфекцию - хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреаплазмы. У меня нет данных о прямом влиянии билирубина на эректильную функцию, но исключить возможность такого влияния нельзя. Часто проблемы в половой жизни связаны со скрытым протеканием в организме хронических воспалительных заболеваний предстательной железы, семенных пузырьков, задней уретры и т. д. Только после проведения обследования можно определиться с дальнейшей тактикой. Удачи!