Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Вика

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.01.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 04.01.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/1516/answer/1517

Заключение врача

Уважаемая Вика! К сожалению, Вы очень кратко описали методику, которая Вас интересует, и совсем не объяснили, с какой целью она должна проводиться. Если Вы имеете ввиду инстилляции (введение лекарственных веществ – в данном случае новокаина - в мочевой пузырь через уретральный катетер), то для их проведения желательно наличие кресла. Если блокады проводят путем введения через эндоскоп новокаина в подслизистый слой мочевого пузыря, то кресло тоже понадобится. Также проводят инъекции в паравезикальное пространство. Уточните, какая именно блокада Вас интересует и для чего она нужна, тогда мы сможет более полно Вас проконсультировать. Удачи!