

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Михаил Б.

**Возраст:** 70

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 07.03.2006 19:03:18

**формирования заключения врача:** 09.03.2006 21:18:10

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/15664/answer/15665>



## Заключение врача

Уважаемый Михаил! Как правило, при камнях верхней трети мочеточника операцией выбора является ДЛТ - дистанционная литотрипсия (дробление на расстоянии). Если в результате ДЛТ камень раздробить не удастся, то в таком случае показано открытое оперативное вмешательство - уретеролитотомия. Контактная литотрипсия (эндоскопическая операция) камней верхней трети часто заканчивается миграцией камня в лоханку почки. Наличие у Вас повышенной температуры говорит о сопутствующем калькулезном пиелонефрите. Какой метод удаления камня выбрать - заочно решать нельзя, необходимо смотреть снимки, УЗИ и все анализы. Но то, что камень необходимо удалять - это бесспорно, т. к. необходимо разрешать существующее нарушение уродинамики (гидронефроз 25 мм). Доверьтесь своим врачам, я уверена, что они выберут оптимальный способ удаления камня. С уважением.