Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Олеся

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.03.2006 18:12:32

формирования заключения врача: 27.03.2006 22:31:59

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/16142/answer/16143

Заключение врача

Уважаемая Олеся! В разных источниках Вы найдете массу противоречивых мнений по этому простому поводу. Виртуально эту проблему решить трудно, необходим непосредственный осмотр, все решается индивидуально. Если крайняя плоть узкая и длинная («хоботок»), то вряд ли такой фимоз разрешится сам, т. е. потребуется хирургическое вмешательство. Причем, чем раньше сделаете операцию, тем лучше (в плане психологической травмы), ориентировочно в 3-4 года. Если проблема заключается в наличии синехий (тонких сращений между головкой полового члена и крайней плотью), то такой фимоз может разрешиться консервативно. И только в таком (!) случае необходимо делать ванночки, несколько оттягивая крайнюю плоть (не насильно! не форсируя!), т. е. помогать открыванию головки. Все вопросы можно разрешить только на очной консультации. Памперсы не оказывают никакого влияния на фимоз и на болезненность при мочеиспускании. Если Вы их одеваете только на прогулку в холодное время года, то ничего страшного. Если будут вопросы – пишите.