Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 66

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.01.2009 13:16:00

формирования заключения врача: 07.01.2009 14:04:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/165603/answer/165604

Заключение врача

Здравствуйте, Александр!

У Вас раннее семяизвержение связано, скорее всего, с подсознательной боязнью ослабления эрекции.

Вам поможет прием какого-нибудь одного из препаратов: Виагра, Левитра или Сиалис, непосредственно перед контактом. Длительно употреблять их не надо, достаточно 3 - 4 раза перед контактом, потом должно все наладиться и без них. Прием препаратов строго после очной консультации врача.

Кроме этого, надо обязательно обследоваться: сделать анализ крови на сахар, холестерин, простатоспецифический антиген и половые гормоны (тестостерон, свободный тестостерон, ГСПГ, ЛГ, ФСГ, пролактин). Следует также исключить другие возможные причины ускоренной эякуляции: уретрит и простатит (для этого выполнить общий мазок и мазок на инфекции, передаваемые половым путем, а также анализ секрета простаты).

С уважением, Константин В. Головченко.