Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Екатерина

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.01.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 15.01.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/1684/answer/1685

Заключение врача

Уважаемая Екатерина! Прежде, чем назначить лечение, надо обследоваться: общий анализ мочи, УЗИ (почек, мочевого пузыря), возможно, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Это заболевание характеризуется воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря, его шейки (так называемый, шеечный цистит), интерстиция (интерстициальный цистит). Обострение этого заболевания происходят после переохлаждения, после перенесенных простудных заболеваний, стрессов, переутомления, в общем, во всех ситуациях, когда происходит снижение защитных функций организма. В своей практической работе при лечении острого цистита я использую следующую схему:

- 1 Исключение острого, соленого, алкоголя
- 2 Мочегонные травы – кукурузные рыльца, толокнянка, хвощ полевой, лист брусники – по 1/3 стакана 3 раза в день после еды
- 3 Препараты из группы фторхинилонов (уросептики) ципролет по 250 мг 3 раза в день – 10 дней
- 4 Метронидазол по 500мг 3 раза в день – 7 дней
- 5 Свечи с красавкой – по 1 свече на ночь в задний проход

Это основная схема. Как правило, этого достаточно для лечения острого, впервые возникшего цистита. Но настоятельно рекомендую все-таки обследование и лечение проходить под контролем опытного квалифицированного уролога. Удачи! Не болейте!