Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александра

Возраст: 39

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.12.2009 23:38:00

формирования заключения врача: 20.12.2009 10:28:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/183618/answer/183619

Заключение врача

Правильнее всего делать повторную спермограмму через 2 - 3 недели, а не через 3 месяца. Суть повторной спермограммы не в оценке сперматогенеза, как такового, а в исключении ошибки диагностики. Через 3 месяца спермограмму делают только в том случае, если необходимо оценить результаты лечения.

Обе спермограммы в пределах нормы, за исключением увеличения количества лейкоцитов во 2 спермограмме. Теперь не совсем понятно, вследствие чего произошло увеличение количества лейкоцитов, так как интервал между спермограммами 3 месяца.

Я рекомендую выполнить повторную спермограмму (как минимум - через 2 - 3 недели для исключения ошибки лаборатории). Если изменения сохранятся, то необходимы осмотр и обследование у андролога для выяснения причины изменений и подбора лечения.