Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Максим

Возраст: 43

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.08.2006 14:51:27

формирования заключения врача: 14.08.2006 12:24:16

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/18776/answer/18777

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаеымй Максим! Причина малого количества спермы при семяизвержении может быть различной – начиная от нарушения проходимости семявыбрасывающих протоков, нарушения выработки спермы, заканчивая патологией шейки мочевого пузыря – состояние, когда сперма вырабатывается, выбрасывается во время полового акта, но выбрасывается не наружу, а забрасывается в мочевой пузырь (так называемая ретроградная эякуляция). Чтобы выяснить есть сперма вообще или нет, надо сдать анализ мочи после полового акта. Если в ней будут выявлены сперматозоиды, то имеет место ретроградная эякуляция (сперма забрасывается в мочевой пузырь) – вероятнее всего это имеет место у Вас из-за нейропатии и нарушения функции шейки мочевого пузыря. Если сперматозоидов нет вообще, то причину надо искать в другом (воспаление, обструкция). Если сперматозоиды есть, то репродуктивная функция сохранена – можно выполнить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Все обследование надо проходить под контролем квалифицированного уролога. Необходимый минимум обследования: общий анализ мочи, анализ мочи после полового акта, секрет простаты, УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы, семенных пузырьков, органов мошонки), экскреторная урография с нисходящей цистоуретрографией. Этот перечень может быть расширен в зависимости от результатов выше изложенных обследований. Удачи!