Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Никита

Возраст: 51

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.08.2006 10:29:29

формирования заключения врача: 30.08.2006 12:25:32

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/19004/answer/19005

Заключение врача

Уважаемый Никита! Гарднереллез передается половым путем, поэтому лечение назначается обоим половым партнерам. Для выяснения причины снижения подвижности сперматозоидов необходимо обследовать - на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1,2), сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, секрет простаты, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки), гормональный фон, визуальный осмотр (на предмет варикоцеле). Это минимальный спектр обследования, который может быть расширен в зависимости от результатов предыдущих обследований. Девушка также должна обследоваться у гинеколога. Для решения всех этих вопросов Вам необходимо обратиться в Центр планирования семьи (или Центр репродукции), где профессионально занимаются подобными вопросами. Выжидать время для зачатия не надо. С уважением.