Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: денис

Возраст: 41

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.12.2006 12:31:11

формирования заключения врача: 07.01.2007 11:26:49

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/21048/answer/21049

Заключение врача

Уважаемый Денис! По последним данным наших и зарубежных авторов простатит не является причиной снижения потенции. Нарушения потенции в 80% случаев имеют сосудистую природу. Для выяснения причины снижения качества эрекции Вам необходимо пройти тщательное обследование: УЗИ или ТРУЗИ простаты, семенных пузырьков, кавернозометрия, УЗИ-допплер сосудов полового члена, регистрацию спонтанных ночных эрекций. Все это возможно при профессиональном подходе. Попробуйте 50 мг Виагры (1 таблетка) за 30-40 минут до полового акта. Можете некоторое время принимать Виагру, потом вполне сможете обходиться без нее. С уважением.