

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** ефим михайлович

**Возраст:** 87

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 26.01.2007 21:10:48

**формирования заключения врача:** 29.01.2007 13:39:21

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/21546/answer/21547>



## Заключение врача

Уважаемый Ефим Михайлович! Вероятнее всего, в Вашем возрасте при таких проблемах надо думать о гиперплазии простаты. Вам необходимо сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы), можно сделать ТРУЗИ (трансректальное УЗИ), анализ крови на PSA (простатспецифический антиген - маркер на злокачественность процесса), общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Есть консервативные методы ведения больных с гиперплазией простаты (применение альфа-адреноблокаторов). Но если сильно выражена инфравезикальная обструкция (т. е. отток мочи из мочевого пузыря), если большое количество остаточной мочи, то тогда показано оперативное лечение. Пишите, если ответила не на все вопросы. С уважением.