Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Инна

Возраст: 39

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 01.02.2007 20:49:57

формирования заключения врача: 05.02.2007 07:34:41

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/21680/answer/21681

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемая Инна! Возможно, имеет место гиперативный мочевой пузырь. Но сначала необходимо исключить инфекцию мочевыводящей системы. Для этого необходимо обследоваться на урогенитальную инфекцию - хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреаплазмы; сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. При невыясненном диагнозе – цистоскопия (инструментальный осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря), УЗИ почек и мочевого пузыря (с опредением количества остаточной мочи), уродинамическое обследование. После получения анализов можно подобрать схему лечения. Выздоравливайте.