Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: глафира

Возраст: 35

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.04.2011 20:37:06

формирования заключения врача: 12.04.2011 08:21:04

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/220628/answer/220694

Заключение врача

эта ситуация требует наблюдения и контроля. очень хорошо, что лоханка уменьшилась с 15 до 8 мм, есть вероятность, что с возраст все придет в норму. что нужно контролировать - кровоток и толщину паренхимы почки, размер ЧЛС и мочеточника, лучше это делать в специализированных центрах, которые занимаются этой патологией (в москве это филатовская больница у детей до 1 года). причин этого состояние может быть много, это заброс мочи обратно из мочевого пузыря, нарушение проходимости в области соединения мочевого пузыря и мочеточника (нарушает проходимость мочи), нарушение проходимости в области соединения почки и мочеточника. грозит это снижением функции почки, поэтому в возрасте 7-8 месяцев можно сделать статическую нефросцинтиграфию для оценки состояния почек(при отсутствие отрицательной динамики по УЗИ). если будут ещё вопросы-обращайтесь лично.