

# Телемедицинская консультация врача-уролога

#### Пациент:

Имя: Наташа

Возраст: 43

Пол: Женский

### Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

#### Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.02.2007 08:11:33

формирования заключения врача: 19.02.2007 13:58:22

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/22076/answer/22077



## Заключение врача

Уважаемая Наташа! От неграмотного применения фуросемида ничего хорошего ожидать нельзя. Этот препарат относится к диуретикам (мочегонным препаратам), действующим на уровне петли Генле. Это наиболее эффективный препарат среди всех других мочегонных средств. Мочегонный эффект наступает быстро, но длится кратковременно. В основном, его применяют при гипертонической болезни, хронической недостаточности кровообращения, отеке мозга, отеке легких, других отечных состояний различного генеза, но никак не для снижения веса. Побочные эффекты заключаются в нарушении кислотно-основного равновесия, водно-электролитного обмена. Нарушения центральной нервной системы характеризуются головной болью, бессонницей, сонливостью. Повышается риск развития камней почек, образуются кристаллы в канальцах почек. Желудочно-кишечные нарушения проявляются снижением аппетита, запорами или поносами, тошнотой, болями в животе, развитием острого панкреатита (воспаление поджелудочной железы), холецистита (воспаление желчного пузыря). Самое частое осложнение при бесконтрольном применении фуросемида - снижение уровня калия в крови, что проявляется мышечной слабостью, вплоть до параличей, нарушением сердечной деятельности - аритмией (нарушение ритма), тахикардией (учащение сердечного ритма). Вы принимали очень большое количество фуросемида длительное время, а нынешнее Ваше состояние обусловлено синдромом отмены, т. е. Ваш организм привык выводить жидкость с посторонней помощью и не может делать это самостоятельно. Снижать дозировку фуросемида в сложившейся ситуации надо очень осторожно, длительно и постепенно. Настоятельно рекомендую делать это под контролем врача (нефролога, терапевта), с обязательным контролем электролитов крови. Удачи!