Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Таня

Возраст: 48

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.03.2007 20:14:22

формирования заключения врача: 06.03.2007 07:42:31

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/22378/answer/22379

Заключение врача

Уважаемая Таня! В представленной спермограмме уменьшено количество сперматозоидов в 1 мл (нижняя граница нормы). Но на основании одной спермограммы делать выводы нельзя. Надо в течение 3-4 недель сдать 2-3 анализа с обязательным соблюдением всех правил сбора. Для выяснения причины бесплодия необходимо обследовать обоих партнеров. Со стороны мужа - на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1,2), сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, секрет простаты, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки), гормональный фон, спермограмму. Это минимальный спектр обследования, который может быть расширен в зависимости от результатов предыдущих обследований. Вы должны обследоваться у гинеколога. Для решения всех этих вопросов Вам необходимо обратиться в Центр планирования семьи (или Центр репродукции), где профессионально занимаются подобными вопросами. С уважением.