Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Николай

Возраст: 48

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 06.07.2007 12:42:29

формирования заключения врача: 07.07.2007 13:27:22

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/24673/answer/24674

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемый Николай! Тактика Ваших врачей абсолютно верна. Для улучшения оттока мочи из почки установка стента была необходимостью. Если в моче имеется повышенное количество лейкоцитов, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам показывает клинически значимое количество бактерий, то назначение антибиотиков необходимо. Естественно, назначаются антибиотики, которые не приносят вреда матери и ребенку. Эритроциты могут содержаться в анализах из-за стента. Замена стента производится только по показаниям (его нефукциональность, нарастание гидронефроза, некоррегируемое повышение температуры и т. д.). Стенты лучше импортные (фирма COOK, RUSCH). Как правило, стент удаляется после родов, а через 2 недели (если все нормально) делается контрольное УЗИ почек. Пишите, если будут еще вопросы.