Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Игорь

Возраст: 54

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.07.2007 10:39:26

формирования заключения врача: 21.07.2007 20:02:43

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/25047/answer/25048

Заключение врача

Уважаемый Игорь! Оксалат размерами 12 мм вряд ли удастся «растворить» консервативными методами. В Вашем случае требуется провести дистанционное дробление камня (ДЛТ), либо выполнитьт перкутанную нефролитолапаксию (чрезкожное удаление камня). Параллельно с удалением камня необходимо лечить воспалительный процесс. Для этого до операции необходимо сделать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам и проводить лечение согласно результату посева. В послеоперационном периоде необходимо будет определить состав камня (в лаборатории), скорректировать диету, водный режим, проводить контроль общего анализа крови, мочи и биохимии крови. Пишите, если будут еще вопросы.