

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Леся Нагорная

Возраст: 22

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.09.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 03.09.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/250/answer/251



Заключение врача

Уважаемая Леся! Вы уже попали ко мне на on-line консультацию. Ваш вопрос очень серьёзный - для того, чтобы удалить почку, сначала надо убедиться в отсутствии её функции. ЭТо можно сделать с помощью экскреторной урографии и радиоизотопного сканирования. Дело в том, что на урограммах часто очень сложно дифференцировать гипоплазированную почку от вторично сморщенной. Если гипоплазированная почка (при сохранении функции) - это миниатюрная норма, то вторично сморщенная почка - это почка, уже пораженная в результате какого-то патологического процесса (т.е. вторично). При односторонней гипоплазии почки больные нуждаются в лечении только при осложнении этой аномалии пиелонефритом. Вы пишите, что у вас за последний год дважды было воспаление (пиелонефрит?). Если возникла такая ситуация, то необходимо пролечить этот пиелонефрит с применением антибиотиков, уросептиков, др. методов. Показания к операции нефрэктомии (удаление почки): прогрессирующий пиелонефрит, не поддающийся лечению; прогрессирующая артериальная гипертензия (злокачественная, т.е. также не поддающаяся коррекции); различные гнойные осложнения (например гнойное расплавление камня почки). При таких состояниях удалять почку надо обязательно, т.к. происходит иммунное воздействие на здоровую почку. Подводя итог, ещё раз: выяснить функционирует ли почка, если пиелонефрит - то серьезно пролечить. Если есть вышеназванные осложнения, то скорее всего надо удалять. Ваш уролог располагает такими данными, которыми невозможно располагать при виртуальной консультации - осмотр, результаты всевозможных исследований (моча, УЗИ и т.д.), возможно, что все взвесив, он принял решение о необходимости операции. Если все-таки придется оперироваться, то сейчас существуют лапароскопические методы операций при гипоплазии почки - это и меньшая травматичность, и хороший косметический эффект. ВАм необходимо вместе с лечащим урологом все взвесить и прийти к общему согласию и тактике. Выздоравливайте.