Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Марина

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.09.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 03.09.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/254/answer/255

Заключение врача

Ещё раз здравствуйте, Марина! Очень приятно встретить такое добросовестное отношение, во-первых, к своему здоровью, а во-вторых, к моим рекомендациям. Судя по результатам обследования, у Вас, скорее всего, цисталгия (нейрогенный мочевой пузырь). Дальнейшая тактика такова: простимулировать иммунную защиту организма (тимоген по 1 мл в/м 1 раз в день 10 дней или иммунал по 15 кап. 3 раза в день 1 месяц), поливитамины. А основные препараты для лечения нестабильного мочевого пузыря - это антихолинэргические препараты, такие как детрузитол (по 1 таб. 2-3 раза в день) или спазмекс (по 1 таб. 2-3 раза в день) или самый доступный по цене дриптан (по 1 таб. 2 раза в день). Надо принимать какой-либо один препарат, причем прием длительный - от 15 дней до месяца, потом надо смотреть результаты. Если результат положительный, то принимать еще около месяца. Также в курс лечения входят физиопроцедуры - амплипульс на область мочевого пузыря, электрофорез с 2% раствором новокаина на область мочевого пузыря - количество процедур 10-15. Настоятельно рекомендую Вам лечиться только под контролем уролога, т.к. иногда необходима коррекция лечения и правильная оценка результатов. Удачи!