Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Михаил

Возраст: 62

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.08.2007 15:22:37

формирования заключения врача: 26.08.2007 17:42:08

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/25785/answer/25786

Заключение врача

Уважаемый Михаил! Сейчас принята такая тактика при опухолях мочевого пузыря T1NxM0: ТУР опухоли, потом через 1 месяц – ТУР ложа опухоли с гистологическим исследованием в обоих случаях. При стадии T1NxM0 также назначается внутрипузырная химиотерапия – через катетер вводится в мочевой пузырь химиопрепарат (интервал между введением, количество инстилляций зависят от вида препарата). После ТУР опухоли мочевого пузыря контрольная цистоскопия выполняется каждые 3 месяца, плюс общеклинические анализы, ЭКГ, УЗИ печени, почек, мочевого пузыря, предстательной железы. С уважением.