Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Alex

Возраст: 75

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 25.09.2007 20:52:24

формирования заключения врача: 25.09.2007 22:46:03

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/26445/answer/26446

Заключение врача

Уважаемый Alex! Камни лоханки, если они вызывают резкое нарушение мочеоттока, необходимо удалять. Это может быть ДЛТ (дистанционная литотрипсия), нефролитолапаксия (чрезкожное удаление камня). Параллельно с удалением камня необходимо лечить воспалительный процесс. Для этого до операции необходимо сделать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам и проводить лечение согласно результату посева. В послеоперационном периоде необходимо будет определить состав камня (в лаборатории), скорректировать диету, водный режим, проводить контроль общего анализа крови, мочи и биохимии крови. Камень размером 1 см сам не отойдет, никакими консервативными методами его «растворить» нельзя. В дальнейшем камень будет расти, а функция почки снижаться. Поэтому я бы рекомендовала камень все же удалить. Какой метод операции выбрать – это надо решать Вашим урологам, заочно такие вопросы решить невозможно.