Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Антон

Возраст: 37

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 16.05.2012 15:19:45

формирования заключения врача: 20.05.2012 22:08:26

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/264297/answer/264504

Заключение врача

Проводится по определённым показаниям для определения уродинамики верхних мочевых путей, под контролем рентгенолога, передозировка лучевой нагрузки не допускается. Если имеется непереносимость иода и провести внутривенную урографию невозможно, то производится катетеризация мочеточника и ретроградное ведение контраста(без попадания его в сосудистое русло). Если же мочеточник непроходим для катетера, то производится хирургическое вмешательство - нефростомия(причём в ряде случаев, н-р, если нет оборудования для пункции полостной системы почки - это открытая, большая операция, под эндотрахеальным наркозом)-устанавливают дренажную трубку в полостную систему почки для оттока мочи, и вводят этот же контраст антеградно - по нефростомев почку, далее - в мочеточник, где останавливается перед препятствием и производится уже следующее вмешательство - с целью устранения препятствия в мочеточнике. Судите сами.