Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.09.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 08.09.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/274/answer/275

Заключение врача

Уважаемый Александр! К настоящему времени предложено много различных оперативных методов лечения гипоспадии, но общими для всех являются рекомендации: производить операцию уже в первые годы жизни, т.е. до появления необратимых процессов в кавернозных телах; первый этап операции - выпрямление полового члена - осуществляют в возрасте до года. Второй этап - создание недостающего отрезка уретры - не ранее, чем через 6 мес. после первого. Как правило, после первого этапа операции наблюдается смещение мочеиспускательного канала и увеличение степени гипоспадии, это не должно Вас пугать. Это явление не влияет на дальнейший ход операции. Эти операции делают одинаково хорошо в областных, краевых урологических отделениях больниц. Больные не нуждаются в каких-либо инструментальных методах обследования и лечения. Успех операции зависит большей частью от технического мастерства оперирующего уролога. Поэтому нет необходимости оперироваться в Москве или Питере. Судя по плану Ваших врачей, они достаточно квалифицированные специалисты, Вам необходимо полностью довериться им. Выздоравливайте!