

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** mva

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 23.03.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 23.03.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/2764/answer/2765>



## Заключение врача

Здравствуйте, mva! Трудно сказать заочно, в Вашем случае необходим непосредственный осмотр. Лучше, если это сделает врач, который Вас оперировал. Боли в яичке, повышенное содержание лейкоцитов в спермограмме могут быть связаны с воспалением предстательной железы, придатка яичка и т. д. Воспаление это может вызвано указанными Вами микроорганизмами. Лечение Вам назначено грамотно. Для контроля Вам надо сделать УЗИ предстательной железы и органов мошонки. В норме одно яичко ниже другого, никакой патологии в этом нет. Природа предусмотрела этот момент для того, чтобы Вы смогли нормально ходить в вертикальном положении. Иначе (если бы яички располагались на одном уровне) Вы не смогли бы сделать ни шага (они просто мешали бы Вам ходить). Думаю, что Вам не стоит беспокоиться по этому поводу. Если же все-таки остается некоторая неуверенность в себе, обратитесь к урологу по месту жительства для непосредственного осмотра. Удачи!

[Шадёркин И.А.](#)