

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.03.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 27.03.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/2816/answer/2817



Заключение врача

Уважаемый Андрей! Хронический простатит - это не приговор, а диагноз, требующий подтверждения. В возникновении хронического простатита принимают участие два основных фактора: застойный, приводящий к развитию морфофункциональных изменений в железе, и инфекционный, осложняющий данные изменения. Что касается инфекционного фактора, то, несмотря на его существенность, он далеко не единственный и не главный фактор. Он редко бывает первичным. Одного лишь проникновения микрофлоры в простату недостаточно для развития её воспаления. Существуют, так называемые, предрасполагающие факторы. Эти факторы могут быть общими (нарушения иммунитета) и местными (нарушение оттока простатического секрета, снижение клеточной устойчивости, ухудшение эффективности кровообращения в органах малого таза, нарушение уродинамики – мочеоттока – нижних мочевых путей). К предрасполагающим факторам относятся также частые половые эксцессы, малоподвижный образ жизни, хронические запоры, токсическое влияние алкоголя. Среди большинства болеющих хроническим простатитом бытует мнение, что основной причиной возникновения заболевания является проникновение инфекции в предстательную железу. Это создает впечатление, что единственная задача лечения простатита - борьба с инфекцией, и в случае ее уничтожения простатит будет излечен. Это мнение глубоко ошибочно, принимая во внимание вышеназванные причины и предрасполагающие факторы. Диагноз хронического простатита ставится на основании результатов обследований - секрета простаты, спермограммы, анализов на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, микоплазмы, гарднереллы, кандиды и т. д.), результатов УЗИ (ТРУЗИ - трансректальное УЗИ), а также жалоб больного. В Вашей ситуации, если были выявлены уреа- (микоплазмы) и хламидии, то сначала надо избавиться от них, причем, не просто пролечиться, а получить результат контрольного анализа через месяц после лечения. Одновременно с Вами лечение должны были пройти половые партнеры, иначе возможно повторное инфицирование. Большое значение в лечении простатита имеют не только лекарственные средства, но и фитотерапия, массаж предстательной железы (по показаниям), инстилляции лекарственных веществ в мочевой пузырь, физиопроцедуры. Если Вас не устраивает Ваш лечащий врач, то найдите такого врача уролога, который будет более внимателен к Вашим проблемам. Пишите, если будут вопросы. Удачи! Шадёркин И.А.