

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.09.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 10.09.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/290/answer/291>



Заключение врача

Уважаемый Владимир! Скорее всего, у Вас был диагноз пиелонефрит, а дополнительные методы обследования назначались с целью выяснить функциональное состояние почек (есть снижение их работы или нет). Нормальные результаты анализов мочи спустя 5 лет можно объяснить длительной ремиссией (т.е. отсутствием в данный момент обострения), хорошей реактивностью Вашего организма, либо отсутствием дополнительных методов обследования (возможно, хронический пиелонефрит протекает в скрытой форме, и при наличии неблагоприятных условий он проявится). Советую все-таки повторно сдать общий анализ мочи, сделать УЗИ почек и предстательной железы. По второму вопросу: уровень белка в моче зависит от многих причин. В норме белка в моче нет. Протеинурия (белок в моче) может быть физиологической и встречаться:

- у здоровых людей при потреблении богатой белками пищи - свежее молоко, мясо
- после значительной физической нагрузки
- в случаях психоэмоционального и соматического стресса
- в случаях повышенной температуры
- после глубокой пальпации почек и травмы почек
- у подростков

Ортостатическая протеинурия возникает только в том случае, если человек стоит, в положении лежа она исчезает. Патологическая протеинурия бывает почечной (говорит о повреждении нефронов - структурной единицы почки) и внепочечной, функциональной или постоянной. Нет смысла перечислять все причины, их очень много, все зависит от данной клинической ситуации. Удачи!