Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 83

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.11.2018 19:40:42

формирования заключения врача: 22.11.2018 08:36:53

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/299575/answer/299587

Заключение врача

Здравствуйте, Владимир! По представленным данным имеет место хроническая задержка мочеиспускания на почве, очевидно, гиперплазии простаты. Ситуация осложнилась уже гидронефротической трансформацией(страдают верхние мочевые пути - почки, в частности). Как 1й этап лечения, надо дренировать мочевой пузырь, причём, в данном случае - цистостомой(производится путём прокола мочевого пузыря через переднюю брюшную стенку- через живот над мочевым пузырём), и установки в полость мочевого пузыря дренажа- трубочки, через которую моча будет вытекать наружу и собираться в мочеприёмнике - пластиковом пакете, герметично закрывающемся. После этой процедуры можно будет вплотную подойти к вопросу о восстановлении мочиспускания естественным путём. Между установлением цистостомы и 2й операцией должно будет пройти не меньше месяца, для того, чтобы восстановилась работа почек. Вам надо поторопиться с принятием решения, пока ситуация с нарушением нормального функционирования почек не приняла необратимого характера. Удачи1