Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** Андрей

**Возраст:** 34

**Пол:** Мужской

## Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 30.12.2018 12:33:21

**формирования заключения врача:** 01.01.2019 15:10:42

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/300131/answer/300145

## Заключение врача

Здравствуйте! Концентрация энтерококка высокая, пролечиться надо. (от гастрита энтерококк в сперме быть не может, никак). Пока лечитесь, надо практиковать защищёный секс. А после - смотря какой антибиотик был. Если с тератогенным действием - то и 2 месяца после окончания лечения. Но в тот период можно будет принимать БАД для улучшения качества спермы.Могу рекомендовать препарат Мираксант (http://miraxant.ru/). По результатам клинических исследований он положительно влияет на сперму и повышает вероятность зачатия. Принимать его нужно в течение 3- 6 месяцев, и сдавать контрольную спермограмму через 3 месяца и через 6 месяцев от начала приема. Такой промежуток связан с тем, что в течение 3 месяцев происходит полное обновление клеточного состава эякулята (спермы). Во время приема препарата можно продолжать попытки забеременеть. Удачи.