

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 43

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.01.2019 05:15:11

формирования заключения врача: 05.01.2019 13:41:08

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/300174/answer/300200>



Заключение врача

Здравствуйте! Судя по эхограммам, имеет место анэхогенное образование в проекции придатка, что характерно для кисты. А диаметр сосуда(предположительно) на первой серии эхограмм - 3 мм - действительно больше нормы, может свидетельствовать о расширении вен левой половины мошонки. Но обычно делают и описывают ещё пробу Вальсальвы- наличие ретроградного кровотока при натуживании - делается при использовании Допплеровского исследования. На второй серии эхограмм нет таких расширенных сосудов, и проба Вальсальвы тоже не выполнена. Но врач-уролог может провести эту пробу и при осмотре стоя и лёжа, лёжа с натуживанием. По-видимому Ваш доктор осмотрел Вас и пришёл к соответствующему выводу. Можете сделать спермограмму для уточнения состояния фертильности. Удачи!