Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Антон

Возраст: 39

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 16.02.2019 13:00:25

формирования заключения врача: 17.02.2019 19:35:25

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/300827/answer/300849

Заключение врача

Здравствуйте! Судя по результатам спермограмм, постоянно повышено количество лейкоцитов, вследствие чего имеют место агрегация и агглютинация, патформы - пограничные значения. Надо сдать эякулят на бакпосев, при условии, что не принимались антибактериальные препараты ни по какому поводу, в течение месяца. По результатам бакпосева - провести лечение. Пока- могу рекомендовать препарат Мираксант (http://miraxant.ru/). По результатам клинических исследований он положительно влияет на сперму (а именно на подвижность сперматозоидов, увеличивает их количество) и повышает вероятность зачатия. Принимать его нужно в течение 3- 6 месяцев, и сдавать контрольную спермограмму через 3 месяца и через 6 месяцев от начала приема. Такой промежуток связан с тем, что в течение 3 месяцев происходит полное обновление клеточного состава эякулята (спермы). Во время приема препарата можно продолжать попытки забеременеть. На результаты бакпосева, в частности, препарат не влияет.Удачи.