

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ольга

Возраст: 46

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.02.2019 18:59:11

формирования заключения врача: 23.02.2019 20:53:57

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/300907/answer/300926>



Заключение врача

Здравствуйте! Причины нарушения уродинамики после операции могут быть самые разнообразные. Много зависит от объёма хирургического вмешательства и соматического состояния пациента(сопутствующей патологии). УЗИ сделать при ненаполненном мочевом пузыре невозможно, а наполнить мочевой пузырь не получится, т.к. моча вытекает через надлонный свищ. Можно сделать ТРУЗИ - через задний проход. Можно сделать МРТ органов малого таза , но эти исследования не позволят ответить на вопрос , почему не восстанавливается самостоятельное мочеиспускание. Для этого надо оценить состояние уретры и мочевого пузыря, что предполагает инвазивные исследования. Возможно, общее состояние не позволяет предпринять эти исследования. Обсудите эти вопросы с Вашими врачами. Удачи!