Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 40

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.09.2019 05:41:01

формирования заключения врача: 05.09.2019 22:12:55

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/302559/answer/302584

Заключение врача

Здравствуйте! Сдайте сперму на бакпосев и на андрофлор (повышены лейк оциты). Конечно, пересдайте через недели 2 анализ на спермограмму(делайте с МАР-тестом). И могу рекомендовать препарат Мираксант (http://miraxant.ru/). По результатам клинических исследований он положительно влияет на сперму (а именно на подвижность сперматозоидов, увеличивает их количество) и повышает вероятность зачатия. Принимать его нужно в течение 3- 6 месяцев, и сдавать контрольную спермограмму через 3 месяца и через 6 месяцев от начала приема. Такой промежуток связан с тем, что в течение 3 месяцев происходит полное обновление клеточного состава эякулята (спермы). Во время приема препарата можно продолжать попытки забеременеть. Удачи.