

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дмитрий

Возраст: 50

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.11.2019 21:29:25

формирования заключения врача: 10.11.2019 22:02:08

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/303235/answer/303239>



Заключение врача

Здравствуйте! Лучше, конечно, видеть бланк анализа, чтобы видеть единицы измерения. Повсей видимости - имеет место лейкоспермия с повышенной агглютинацией. Надо сдать эякулят на бакпосев и на андрофлор, пролечиться в соответствии с полученными результатами. В целом для улучшения фертильности могу рекомендовать препарат Мираксант (<http://miraxant.ru/>). По результатам клинических исследований он положительно влияет на сперму (а именно на подвижность сперматозоидов, увеличивает их количество) и повышает вероятность зачатия. Принимать его нужно в течение 3-6 месяцев, и сдавать контрольную спермограмму через 3 месяца и через 6 месяцев от начала приема. Такой промежуток связан с тем, что в течение 3 месяцев происходит полное обновление клеточного состава эякулята (спермы). Во время приема препарата можно продолжать попытки забеременеть. Удачи.