Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Anna

Возраст: 45

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.02.2008 10:03:38

формирования заключения врача: 26.02.2008 18:54:44

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/30373/answer/30374

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемая Anna! Цистит, связанный с половым актом может иметь две причины - инфекция и низкое расположение уретры. 1. Вам необходимо исключить ЗППП (хламидии, трихомонады, кандиды. уреаплазмы, микоплазмы, гарднереллы), выполнить посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Если что-то выявится - провести курс лечения с обязательными контрольными анализами. 2. Необходим непосредственный осмотр уролога. Если у Вас низкое расположение уретры, то выделения из влагалища во время полового акта попадают на наружное отверстие уретры, и потом восходящим путем - в мочевой пузырь. Лечение в обоих случаях назначает уролог. Удачи!