Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анатолий

Возраст: 38

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.06.2020 15:05:00

формирования заключения врача: 16.06.2020 12:34:41

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/305764/answer/305773

Заключение врача

По результатам данной спермограммы выявлена агглютинация (это склеивание сперматозоидов между собой), что снижает вероятность оплодотворения. В данном случае это может быть вследствие того, что спермограмма выполнена не своевременно после получения эякулята (спермы) или могут быть другие причины, например наличие инфекций. Чтобы это исключить , необходимо повторить спермограмму через 2—3 недели на фоне 3—5 дневного полового воздержания. Рекомендуется оценивать спермограмму по Крюгеру, что даёт более точные и достоверные результаты. Спермограмму стоит показать урологу—андрологу для оценки результатов и определения дальнейшей тактики. Помимо этого, уролог-андролог принимает во внимание такие факторы, как возраст супруги, длительность отсутствия наступления беременности в паре,. Также, очень важно иметь представление о состоянии репродуктивного здоровья не только мужчины, но и женщины, которое оценивает врач-репродуктолог. Затем уролог—андролог может обсуждать вопросы достижения беременности в паре, методы лечения при их необходимости.