Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Антон

Возраст: 77

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.07.2020 21:07:38

формирования заключения врача: 25.07.2020 18:58:34

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/306149/answer/306208

Заключение врача

Здравствуйте! Мы уже обсуждали этот вопрос. В первую очередь надо понимать, в чем причина невозможности самостоятельного мочеиспускания, - это - ключевой вопрос, тогда можно оценивать возможность восстановления акта мочеиспускания. Напишите - какая причина невозможности самостоятельного мочеиспускания, какой объём предстательной железы, какое значение ПСА. В отношении рецистостом - в настоящее время, при возможности Уз-навигации, обычно даже с повторной цистостомией(пункционной) - не возникает критических проблем, хотя, безусловно, эта хирургическая процедура, при вероятности спаечного рубцового процесса, сопряжена со значительными техническими трудностями. Навсегда оставлять уретральный катетер нельзя. Возможность удаления уретрального катетера с целью восстановления самостоятельного мочеиспускания и сопутствующую терапию(например, альфа- адреноблокаторы), необходимо обсудить, прежде всего, с лечащим врачом. Удачи!