Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Наталья

Возраст: 45

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.12.2020 17:07:50

формирования заключения врача: 04.12.2020 10:20:02

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/307121/answer/307133

Заключение врача

Здравствуйте! Лечение вполне адекватно. До восстановления слизистой после хирургического вмешательства должно пройти не менее месяца, что объясняет лейкоцитурию. И сами по себе инстилляции провоцируют лейкоцитурию. Через 1,5 месяца после последнего приёма антибактериального препарата(это был цифран 1000мг/сутки курсом, как можно понять), сделайте бакпосев мочи. По окончании приёма канефрона можно рекомендовать комплекс Цисталис курсом(помогает бороться с возбудителем заболевания, способствует уменьшению болей и воспаления, укрепляет защитный слизистый барьер мочевого пузыря, снижает частоту повторных обострений). Удачи!